


Avertissements ILE DE FRANCE agricoles



ISSN 0767 - 5542

Grandes cultures

BULLETIN N° 675 DU 8 OCTOBRE 1991 - ENVOI N° 23

COLZA : Traitez vite contre les pucerons
CEREALES : Situation viroses.

COLZA

■ **STADE** : 2 à 4 feuilles

■ **RAVAGEURS** :

* Situation :

– Peu de morsures d'altises;
– Les pucerons verts et cendrés ont bien colonisé les cultures. Des symptômes de crispation ou de décoloration sont visibles sur feuilles. 80 à 100% des plantes sont porteuses en moyenne d'une ou deux petites colonies de pucerons verts.

* Préconisation :

Le seuil d'intervention est souvent atteint. Traitez sans tarder avec KARATE 0,15 l/ha ou KARATE K 1,25 l/ha.

■ **DESHERBAGE ANTIGRAMINEES** : (Voir tableau page 2)

CEREALES

■ **JNO** : Dans notre dernier bulletin, des données sur le taux de virus dans nos maïs indiquaient un risque de virose très faible. Or, des vents importants ont transporté des pucerons porteurs de virus, sur des distances de 300 à 400 km. Ces pucerons venus du Sud s'installent sur nos repousses où ils vont multiplier le virus et augmenter le risque de contamination précoce.

► Affaire à suivre dans nos prochains bulletins.

7105



LES ANTIGRAMINEES A ACTION FOLIAIRE SUR COLZA

Ils s'utilisent quel que soit le stade du colza, à partir du stade 3 feuilles des graminées. La végétation doit être active et la température comprise entre 10 et 20 ° pour une pénétration et une systémie optimale de la matière active. Contre les graminées vivaces, il est nécessaire de doubler les doses. La dose d'huile est modulable en fonction des conditions climatiques.

Matières actives	Spécialités commerciales (<i>Firmes</i>)	Doses /ha	Observations
alloxydime-sodium	FERVIN (Schering)	1 kg + 3 l huile Schering	- Sur graminées annuelles.
		1 à 1,25 kg + 3 l huile Schering	- Sur graminées vivaces.
sethoxydime	FERVINAL (Schering)	2 l + 3 l huile Schering	- Sur graminées annuelles.
		3 l + 3 l huile Schering	- Sur graminées vivaces.
fluazifop-p-butyl	FUSILADE X2 + AGRAL (Sopra)	0,75 l + 0,1 % Agral	- Sur graminées annuelles.
		1,5 l + 0,1 % Agral	- Sur graminées vivaces.
haloxyfop-éthoxyéthyl	GALLANT (Dow Elanco)	1 l	- Application à l'automne uniquement. - Sur graminées annuelles.
		2 l	- Sur graminées vivaces et pâturins.
quizalofop-éthyl isomère D	TARGA D+ (Peppo)	0,5 l + 2 l huile Sifren	- Sur graminées annuelles.
		1,25 l + 2 l huile Sifren	- Sur graminées vivaces au stade 15 à 20 cm et pâturins de 3 feuilles maximum et ray-grass après tallage.
cycloxydime	STRATOS (BASF)	1,25 l + 2 l huile 970	- Sur graminées annuelles.
		3 l + 2 l huile 970	- Sur graminées vivaces.
propaquizafop	AGIL (La Quinoléine)	1,2 l	- Sur graminées annuelles.
		2 l	- Sur graminées vivaces.